

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'su :18.12.2015/10452

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
*Bağ	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	100 ml/100 L su	21 gün
Domates	Kurşuni küf (Botrytis cinerea)	125 ml/100 L su	3 gün
Elma	Karaleke (Venturia inaequalis)	50 ml/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Kurşuni Küf: Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde; 1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında, 2. Ve diğer uygulamalar. Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde; 1. Uygulama çiçeklenmeden hemen önce, 2. Uygulama: Kapalı salımlı döneminde, 3. Ve diğer uygulamalar. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domateste Kurşuni Küf: Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün ara ile hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Elma Karalekesi: 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süreleri dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BARTOS SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir Fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BARTOS SC**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLILIK DURUMU

BARTOS SC, alüminyum içeren bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

BARTOS SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	D1:9	Fungisit (Mantar ilacı)
		300 g/L Pyrimethanil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalarda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buharını ve zerrecelerini teneffüs etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İnsan çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvan girmesinde sınırlama yoktur.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürününün boş ambalajının ¼ ü kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri ve mukozayı tahriş edebilir. Baş ağrısı, halsizlik, ishal, metahemoglobinaya bağlı cyonosis'e neden olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Deri ile teması halinde; Kirlenmiş veya bitki koruma ürünü bulaşmış elbiseler hemen çıkartılır. Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Şikâyetler devam ederse doktor müdahalesi gereklidir.

Gözle teması halinde; Gözler derhal bol suyla yıkanmalıdır. Şikâyetler devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde; Hastayı kusturmamız. Ağzı bol suyla yıkanmalıdır. Gerekirse aktif kömür verilir. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Soluması halinde; Kazazede temiz havaya çıkartılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya methylene blue kullanınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV dahil)
İÇİNDEKİLER:1- Pyrimethanil, 2- Glycol
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ:DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ :

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Ürün artıklarını akarsu, göl, havuz suları ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Uygulama esnasında genel koruma tedbirlerine mutlaka uyunuz.
- Karışımın tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ VE ÜRETİM TESİSİNİN ADI-ADRESİ

Jingbo Agrochemicals Technology Co.,Ltd.

Economic Development Zone, Boxing County, Shangdong Province, China

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Havutlu Mahallesi Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt. No:846/Z-01 Yüreğir

/Adana/ Türkiye

Tel:0 322 459 78 81 Fax:0 322 459 78 82

info@oncropscience.com.tr



ONCROPSİENCE KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Havutlu Mah. Karataş Bulv. No: 846/Z-01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 81 - Fax: 0322 459 78 82
Tic Sic No: 270900
V.D. No: 6430381460

M. Şukru ABAY

Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

18 Ekim 2016
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.