

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH VE NO'su : 24.12.2024 / 13364

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
MISIR	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Zincir Pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Yabani bamy (Hibiscus trionum) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Aralık 2024



ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

BLUMİS OD

Yağda dağılabilen (OD)

GRUBU	F2:B	HERBİSİT(Yabancıot ilacı)
-------	------	---------------------------

75 g/l Mesotrione + 30 g/l. Nicosulfuron

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği, insan ve hayvan gıda maddelerinden uzak yerlerde depolayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV dahil) :
İÇİNDEKİLER: Mesotrione, Nicosulfuron
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P391 Döküntüleri toplayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.

KULLANMADAN ÖNCE KUVVETLİCE ÇALKALAYINIZ DONDAN KORUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
-Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Uygulamadan sonra kullandığınız uygulama makinasını iyice yıkayınız.
-Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
-Uygulamadan sonra herhangi bir şey yiyip içmeden, sigara kullanmadan önce ellerinizi ve bitki koruma ürününe maruz kalmış vücut kısımlarını yıkayınız.



ONCROPSCIENCE KİM.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Karateş Bulv. No: 17/2 - 01 Yüreğir/ADANA
Tel: 0322 459 78 82 - Fax: 0322 459 78 82
Tic Sic No: 0430381160

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ : BLUMİS OD , mısır tarlalarındaki dar ve geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden, Mesotrione ve Nicosulfuron, maddelerini oil dispersion formülasyonda ihtiva eden seçici bir herbisittir. **BLUMİS OD**, esas itibarıyla yeşil aksamdan (yaprak, gövde) alınır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır. Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütikula oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stress koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.

DİKKAT:

- **BLUMİS OD**, sadece danelik mısırdaki kullanılmak üzere geliştirilen özel bir herbisittir. Tohumluk olarak üretilen mısırlarda, tatlı mısır ve patlamalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz.
- Diğer sulfonilurea' lı bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı, ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır.
- Yeni uygulama yapılmış alanlara otlama için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.
- Yabancı otlar ve mısır ıslak iken uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama sırasında ürünün rüzgar ile çevredeki diğer kültür bitkisi yetiştirilen alanlara taşınması engellenmelidir.

Münavebe ve Tekrar Ekim : Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir.

Münavebe bitkisi olarak 15 cm derinlikte toprak işlemlerinden sonra kışlık buğday, arpa, ayçiçeği, patates, soya, yer fıstığı, kanola ekilebilir ve sebze (fide) dikilebilir.

Şekerpancarı, bezelye ,bakla ve sebze (tohum) ekimi mısır hasadına müteakip 9 ay sonra 15 cm derinlikte toprak işlemlerinden sonra yapılabilir.

Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında **BLUMİS OD**, mısır tarlalarında iyi derecede tolere edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BLUMİS OD isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2 ve B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BLUMİS OD** yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2 ve B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Aralık 2024



ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

BLUMİS OD

Yağda dağılabilen (OD)

GRUBU	F2:B	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	------	----------------------------

75 g/l Mesotrione + 30 g/l. Nicosulfuron

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Ağzı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Derhal doktora başvurun.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. Gürpa Tohum Apt.
No:846/Z-01 Yüreğir / Adana/ Türkiye
Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax:0 (322) 459 78 82
E-posta : info@oncropsience.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

JU AGRI SCIENCES Private Limited
Ofis Adres: 2302, Express Trade, Tower II, 3rd Floor, B-36, Sector-132, Noida-201301(U.P.), Hindistan.
Fabrika Adres: A-61/3, U.P.S.I.D.C. Industrial Area, Sikandrabad, District - Bulandshahr, U.P., Hindistan.

ONC
ONCROPSİENCE KİM.SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Bulv. No:846/Z-01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 81 - Fax: 0322 459 78 82
Yüreğir V.D. 6430381160

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı