

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No : 07.02.2025 / 13328

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Domates (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Hıyar (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Kornişon (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Kabak (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Pamuk	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 g / da (Ergin, nimf)	21 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Ergin, nimf)	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ

Biber (sera), domates (sera), hıyar (sera), kornişon (sera) ve kabakta (sera) yaprakbitlerine karşı ilaçlama zamanını saptama amacı ile dikili alana köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Bitkilerinde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek, ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır. Yaprakbiti popülasyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık arttığında popülasyon aniden düşer. Bu husus ilaçlamalarda dikkate alınmalıdır.

Şeftali de şeftali yaprakbitine karşı Ağaçlarda çiçek tomurcuklarının belirmesinden, sonra yapılan kontrollerde popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, taraklanma döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Bir sezonda birden fazla uygulama yapmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CHORD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 29 olarak sınıflandırılmış bir İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CHORD' un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 29 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

CHORD

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	29	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

%50 Flonicamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN KONULAR DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Soluması halinde: Acilen temiz havaya çıkarınız. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Ciltle teması halinde: Deriyi sabun ve bol su ile 15-20 dakika yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Gözle teması halinde: Gözü açık tutarak hemen 15-20 dakika süre ile bol su ile yıkanmalıdır. Kontakt lensleri çıkarın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın. Ağız suyla çalkalayınız. Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

07.02.2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAPUL EDİLMİŞTİR.

Osman ARI
Daire Başkanı

Net Miktarı :
Perakende Satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER: Flonicamid
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ :

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız

P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz ve sigarada içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara ve Balıklara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiye edilen bitkilerde tavsiye edilen dozlarda ve şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİM TESİSİ:

ANHUI SIDA PESTICIDE CHEMICALS CO., LTD.

Wujiang Hexian Anhui Fine Chemical Park Çin

ÜRETİCİ FİRMA:

NANJING ESENCE FINE-CHEMICAL Co., Ltd.

4 th Floor, Building 5, No.150 Pubin Road,Nanjing,211800, Çin

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

Havutlu Mah. Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt.No:846/Z01

Yüreğir /ADANA

Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax:0 (322) 459 78 82

ONCROPSİENCE KİM.SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Blv. No: 846 Z - Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 81 Fax: 0322 459 78 82

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No : 07.02.2025 / 13328

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Domates (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Hıyar (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Kornişon (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Kabak (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Nimf-Ergin)	3 gün
Pamuk	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 g/da (Ergin,nimf)	21 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g / 100 L su (Ergin,nimf)	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ

Biber (sera), domates (sera), hıyar (sera), kornişon (sera) ve kabakta (sera) yaprakbitlerine karşı ilaçlama zamanını saptama amacı ile dikili alana köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Bitkilerinde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır. Yaprakbiti popülasyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık arttığında popülasyon aniden düşer. Bu husus ilaçlamalarda dikkate alınmalıdır.

Şeftali de şeftali yaprakbitine karşı Ağaçlarda çiçek tomurcuklarının belirmesinden, sonra yapılan kontrollerde popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, taraklanma döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Bir sezonda birden fazla uygulama yapmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CHORD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 29 olarak sınıflandırılmış bir İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CHORD' un aynı sezonda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 29 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

CHORD

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	29	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

%50 Flonicamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN KONULAR DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Soluması halinde: Acilen temiz havaya çıkarınız. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Ciltle teması halinde: Deriyi sabun ve bol su ile 15-20 dakika yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Gözle teması halinde: Gözü açık tutarak hemen 15-20 dakika süre ile bol su ile yıkanmalıdır. Kontakt lensleri çıkarın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın. Ağız suyla çalkalayınız. Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

07.02.2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAPUL EDİLMİŞTİR.

Osman ARI
Daire Başkanı

Net Miktarı :
Perakende Satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER: Flonicamid
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ :

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız
P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz ve sigarada içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimi arayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara ve Balıklara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiye edilen bitkilerde tavsiye edilen dozlarda ve şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİM TESİSİ:

ANHUI SIDA PESTICIDE CHEMICALS CO., LTD.

Wujiang Hexian Anhui Fine Chemical Park Çin

ÜRETİCİ FİRMA:

NANJING ESENCE FINE-CHEMICAL Co., Ltd.

4 th Floor, Building 5, No.150 Pubin Road,Nanjing,211800, Çin

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

Havutlu Mah. Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt.No:846/Z01

Yüreğir /ADANA

Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax:0 (322) 459 78 82

ONC
ONCROPSİENCE KİM.SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Blv. No: 846 Z-01 Yüreğir /ADANA
Tel: 0322 459 78 81 Fax: 0322 459 78 82