

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİH VE NO'su : 12-12-2024 / 13353

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı                  | Zararlı Organizma Adı                                       | Uygulama Dozu ve Dönemi                                 | Son Uygulama İle Hasat Arası Süre     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Bağ ✓                    | Bağda salkım güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )              | 15 ml/100 l su (yumurta)                                | 3 gün (sofralık)<br>28 gün (şaraplık) |
| Ayva ✓                     | Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )                     | 12,5 ml/100 l su (yumurta)                              | 14 gün                                |
| Erik ✓                     | Şeftali güvesi ( <i>Anarsia lineatella</i> )                | 20 ml/100 l su                                          | 14 gün                                |
| Pamuk ✓                    | Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )          | 17,5 ml /da, larva                                      | 21 gün                                |
|                            | Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )                   | 17,5 ml /da                                             | 21 gün                                |
|                            | Ökenlikurt ( <i>Earias insulana</i> )                       | 20 ml/da                                                |                                       |
| Şeftali-Kayısı ✓           | Şeftali güvesi ( <i>Anarsia lineatella</i> )                | 20 ml/100 l su                                          | 14 gün                                |
|                            | Doğu Meyve güvesi ( <i>Cydia molesta</i> )                  | 17,5 ml/100 l su                                        |                                       |
| Elma-Armut ✓               | Armut yaprak galerigüvesi ( <i>Leucoptera scitella</i> )    | 17,5 ml/100 l su                                        | 14 gün                                |
|                            | Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )                     | 12,5 ml/100 l su (yumurta)                              |                                       |
| Patates ✓                  | Patates Böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )         | 6 ml /da (larva)                                        | 14 gün                                |
|                            | Patates Güvesi ( <i>Phthorimaea operculella</i> )           | 20 ml /da                                               |                                       |
| Mısır ✓                    | Bozkurt ( <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i> ) | 15 ml/da                                                |                                       |
|                            | Mısırkurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )                    | 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)                  | 14 gün                                |
|                            | Mısır Koçankurdu ( <i>Sesamia spp.</i> )                    | 35 ml/da (Damla Sulama İle) (15 gün ara ile 2 uygulama) | 21 gün                                |
| Mısır (Damla Sulama İle) ✓ | Mısır Koçankurdu ( <i>Sesamia spp.</i> )                    | 35 ml/da (Damla Sulama İle) (15 gün ara ile 2 uygulama) |                                       |
|                            | Mısırkurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )                    | 35 ml/da (Damla Sulama İle) (15 gün ara ile 2 uygulama) |                                       |

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA ALETİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

## ONCAGEN 20 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| Grup | 28 | İnsektisit (Böcek İlacı) |
|------|----|--------------------------|
|------|----|--------------------------|

200 g/l Chlorantraniliprole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. İlaç kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.
- İnsan çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

**Yutma:** Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

**Göz Teması:** Kontak lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

**Cilt Teması:** Deriye bulaşırsa, suyla iyice yıkayınız. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Solumum:** Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

#### ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

17 Aralık 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Bölge Başkanı

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KD)  
İÇİNDEKİLER:  
Chlorantraniliprole  
ZARARLILIK İŞARETLERİ

Ek-2



#### UYARI KELİMESİ: Dikkat ZARARLILIK İFADELERİ:

- ✓ H410 Uzun süreli etkililerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.
- ✓ EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

- ✓ P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- ✓ P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
- ✓ P391 Döküntüleri toplayın.
- ✓ P280 Koruma eldiveni/koruyucu giysi kullanınız.
- ✓ P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Sulara bulaştırmayınız, balıklara zehirlidir.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- ✓ İpek böceklerine etkisi olduğu için, ilaçlama anında ilacın rüzgârla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.
- ✓ Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- ✓ Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadıkları eksiklikler neçesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ONC  
ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.  
Havutlu Mah. No: 14672-01 Yüreğir / ADANA  
Tel: 0322 459 78 82  
Fax: 0322 459 78 82  
M. Şükrü ABAY  
Teknik Müdür

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**

**Bağ salıma güvesi:** Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklar toplamı birinci dölde 95-100 gün derece, ikinci dölde 450-460 gün derece, üçüncü dölde 970-980 gün dereceye ulaşması ve bitki fenolojisi, birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve bağda ilk yumurta görülmeden ilaçlamaya karar verilir. Her dölde karşı bir ilaçlama yapılır. Bağda sezon içinde sofralık üzümlerde 2, şaraplık üzümlerde 1'den fazla **ONCAGEN 20 SC**, uygulaması yapmayınız.

**Elma, Armut, Ayva,**

**Elma iç kurdu:** Elma içkurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut ve ayva tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

**Elma, Armut-Armu yaprak galeri güvesi:** Her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan yaprak alınarak canlı larva sayımı yapılır. Yaprak başına 4 veya daha fazla canlı larva ve parazitlenme oranı çok düşükse uygulama yapılır.

**Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama,** zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır.

**Şeftali Doğu Meyve güvesi için ilaçlama,** tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı 400 gün-dereceye ulaştığında ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez yapılır. Diğer döllere karşı ilaçlamaya karar vermek için tuzak başına haftada 20 ve üzeri kelebek yakalanması gerekir. Kullanılan ilacın etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. **ONCAGEN 20 SC'** başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Şeftalide sezon içinde 2'den fazla **ONCAGEN 20 SC'** uygulaması yapmayınız. Elma, armut, erik, ayva, kayısı ve şeftalide sezon içerisinde aynı yerde 2'den fazla **ONCAGEN 20 SC'** uygulaması yapmayınız.

**Pamuk:**

**Pamukta Yeşilkurta** karşı rast gele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 metrelik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulama karar verilir.

İlaçlı mücadelede en iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için uygulama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

**Pamuk yaprak kurdu:** 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Uygulama larvalar yumurtadan yeni çıktığında ve henüz dağılmadan yapılmalıdır.

**Pamukta Dikenlikurt:** Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğu koza sürveyinde %10 bulaşık koza varsa ilaçlama yapılmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde 2'den fazla **ONCAGEN 20 SC** uygulaması yapmayınız.

**Mısır koçankurdu ve Mısırkurdu** zararlıları ile mücadelede birinci üründe 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkide bulaşma (yumurta kümesi veya yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenilikler) tespit edilir. Bulaşık bitki sayısının %5 ve üzerinde olması durumunda uygulama yapılır. İkinci üründe, 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte mücadeleye karar verilir. Mısır koçankurdu yumurta kümeleri yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzünde; Mısırkurdu yumurta kümeleri ise genelde yaprakların alt yüzünde bulunur. İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 uygulama yapılmalıdır.

**Mısırdaki bozkurda** karşı mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayrı yerde 3'er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda uygulama yapılmalıdır. Mısırdaki sezon içinde aynı yerde 2'den fazla **ONCAGEN 20 SC'** uygulaması yapmayınız. Ek ilaçlamaların gerekli olduğu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar kullanılmalıdır.

**Patates Böceğine** karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölde karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölde uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.



ONCROPSİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

**ONCAGEN 20 SC**


Süspansiyon Konsantre (SC)

| Grup | 28 | İnsektisit (Böcek İlacı) |
|------|----|--------------------------|
|------|----|--------------------------|

200 g/l Chlorantraniliprole

ONC  
ONCROPSİENCE KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Havutlu Mah. Karayolu Bul. No: 846 / Z - 01 Yüreğir / ADANA  
Tel: 0322 458 78 81 - Fax: 0322 459 78 81  
Yüreğir V.D. 6430381160

**M. Şükri ABAY**  
Teknik Müdür



17 Aralık 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

**Patates Çukesi:** Bitki çıkışından sonra ergin çıkış zamanını belirlemek amacıyla asılan eşeysel çekici tuzakta ilk ergin yakalandığında, birinci ilaçlama, bir ay sonra ikinci ilaçlama ve hasattan 15 gün önce farklı etki mekanizmasına sahip bir ilaçla üçüncü bir uygulamanın yapılması tavsiye edilir. Patateste sezon içinde 2'den fazla ONCAGEN 20 SC uygulaması yapmayınız.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ONCAGEN 20 SC'adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ONCAGEN 20 SC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

# ONCAGEN 20 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

|      |    |                          |
|------|----|--------------------------|
| Grup | 28 | İnsektisit (Böcek İlacı) |
|------|----|--------------------------|

200 g/l Chlorantraniliprole


#### ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ :

M/S JU AGRI SCIENCES PRIVATE LIMITED  
Ofis Adresi: 2302, Express Trade 2, Tower II, 3<sup>rd</sup> floor, B-36, Sector-132, Noida- 201301(U.P.), Hindistan  
Fabrika Adresi: A-73, UPSIDC, Industrial Area, Sikandrabad, District-Bulandshahr, Uttar Pradesh, Pin- 203205, Hindistan

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti  
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. Gürpa Tohumlukları No:846/Z-01 Yüreğir / Adana/ Türkiye  
Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax:0 (322) 459 78 81  
E-posta : [info@oncropscience.com.tr](mailto:info@oncropscience.com.tr)

  
ONCROPSCIENCE KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Havutlu Mah. Karataş Bulv. No: 846/Z-01 Yüreğir / ADANA  
Tel: 0322 459 78 81 - Fax: 0322 459 78 82  
Yüreğir V.D. 6430381160  
**M. Şükrü ABAY**  
Teknik Müdür



17 Aralık 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

8-4 f