

Kullanılacağı Bitki Ve Zararlı Organizmalar	

HER UYGULAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ HASTALIKLI KISIMLAR DEZENFEKTANA BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.

Taşıyıcı dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce aynı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karşıtırmaya işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ONFOSET 80 WP bitki öz suyunda yaprakтан köke, kökten yapığa taşınabilen iki yönlü sistemlik bir fungisitir. O nedenle, uygulandığından 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve homojen olarak bitki öz suyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.



HIYAR, KAVUN MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında yada çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

TURUNÇGİLLERDE MEYVELERDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKANMASI
Meyve enfeksiyonlarına karşı

1. uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.

2. uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Gövde enfeksiyonlarına karşı

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgillerde hasat sonrası kahve rengi meyve çürüklüğü: Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.

ARMUT ATEŞ YANIKLIĞI: Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte 1'er uygulama. Hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir 3.uygulama gerekebilir.

SOGAN MİLDİYÖSÜ: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

DOMATES MİLDİYÖSÜ: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz küllü konidi örtünün görülmesi ile başlanır. Bitkinin yaprak alt yüzeylerinin ve her tarafın iyice kaplanması gerekir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ONFOSET 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ONFOSET 80 WP**'in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Yaprak gübreleri ve bakırlı bitki koruma ürünleriyle karışmaz. Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürününün yapraklara nüfuzunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. Karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta ön denemeler yapılması önerilir.



ONCROPSİENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ONFOSET 80 WP

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	U:33	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

%80 FOSETYL-AL

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üretici bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA ADI ADRESİ:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, No.8, Lengjing Street, 315010 Ningbo, Zhejiang, P.R. Çin

ÜRETİM TESİSİ ADI ADRESİ:

ZHEJIANG JIAHUA CHEMICAL CO., LTD.

Majian Town, Lanxi City, Zhejiang, Çin

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI ADRESİ:

ONCROPSİENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

Havutlu Mahallesi Karatas Bulvarı Gürpa Tohum Apt. No.846/Z-01 Yüreğir, Adana, Türkiye

Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax: 0 (322) 459 78 82

E-posta : info@oncropscience.com.tr



M. Şükrü ABAY

Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
05 Temmuz 2021

Dr. Nezir ÇAKIR
Daire Başkanı