

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No.su: 12.03.2025/13461

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ANTEPFISTIĞI	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	50 g/100 L su	-
ARMUT	Armut Karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Armut memeli pası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	40 g/100 L su	14 gün
AYVA	Ayva Monilyası (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	50 g/100 L su	14 gün
ELMA	Elma küllemesi (<i>Podospheara leucotricha</i>)	40 g/100 L su	14 gün
	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Elma Depo Hastalıkları (<i>Penicillium</i> spp. <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	40 g/100 L su	14 gün
	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
KAYISI	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
NEKTARİN	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
ŞEFTALİ	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
VIŞNE-KIRAZ	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	7 gün
	Meyve monilyası (Mumya) (<i>Monilinia fructigena</i>)		
NAR	Narda Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g/100 L su	-
MANDARİN	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i> f. sp. <i>citri</i>)	40 g/100 L su	7 gün
NOHUT	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	50 g/da	10 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürününün özellikleri: Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungisittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir bitki koruma ürünü olarak geliştirilmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Mart 2025



ONCROPS SCIENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ONROBİN

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	FUNGİSİT (Mantarlıcı)
-------	------	-------	-----------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulursa: Yutulmuşsa, hemen tıbbi yardım isteyiniz ve ürünün etiket ve ambalajını gösteriniz. Hastayı kusturmayınız.

Gözlere teması: Hemen bol su ile asgari 15 dakika göz kapağı dahil gözleri iyice çalkalayınız. Kontak lens kullanılıyor ise, çıkarınız. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

Cilde teması: İlaça bulaşık giysileri hemen çıkarınız. Bulaşan yerleri hemen bol su ile yıkayarak temizleyiniz. Cilt tahrişi kalıcı ise, doktora müracaat edin.

Solumun yoluyla: Temiz havaya çıkın. Solumun düzensiz yahut durmuş ise, suni teneffüs uygulayın. Hastayı sıcak tutarak, istirahat ettirin. Doktor çağırın veya hemen Zehir Danışma Merkezini arayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV' li) :

İÇİNDEKİLER:

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI İFADESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H331 Soluması halinde toksiktir.

H335 Solumun yolu tahrişine yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.


P264 Elleçleme den sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



ONC
ONCROPS SCIENCE KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Bulv. No: 846 / Z - 01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 01 - Fax: 0322 459 78 02
Yürürlük Y.D. 6400381160

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür

Antepfıstığına karazenk:

İlk ilaçlama hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Armut karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut memeli pası:

1. uygulama: Çiçek gözleri patlamak üzere iken,
2. uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90'ı döküldüğü devrede,
4. ve diğer uygulamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayva monilyası:

1. uygulama: Çiçeklerin % 5 açtığı dönemde
2. uygulama: Çiçeklerin % 50' si açtığında
3. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Elma küllemesi:

1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğü dönemde,
3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıkla uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma depo hastalıkları: Hasattan 14 gün önce tek ilaçlama yapılır.

Kayısı, Şeftali, Nektarin, Vişne-Kiraz çiçek monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)
2. uygulama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Kiraz/Vişne meyve monilyası: Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Nar kahverengi leke hastalığı:

1. uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığı dönemde.
2. uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde.
3. uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Mandarin kahverengi leke hastalığı:

İlaçlamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için 14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Nohut antraknozu: İlaçlamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ONROBİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2;7 / C3;11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ONROBİN**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C2;7 / C3;11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

DİĞER BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİYLE KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

12 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



ONCROPSİENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ONROBİN

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUP	C2;7	C3;11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------	-------------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ambalajları kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız,
- Artan karışımı kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Kullanılmayan bitki koruma ürününü, ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, kilit altında saklayınız.
- Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı suyla yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde çıkabilecek hatalar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİM TESİSİ:

SHIJIAZHANG CITY SENTAY CHEMICAL CO., LTD
SOUTH ZHENGAO ROAD, WESTSIDE, SHENZE
COUNTY, SHIJIAZHANG, HEBEI ÇİN

ÜRETİCİ FİRMA:

HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE CO.,LTD.
ROOM 1606, UNIT 3, BUILDING 3, WANDA COMMERCIAL
CENTER, NO. 666, HANGXING ROAD, GONGSHU DISTRICT,
HANGZHOU, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSİENCE KİM.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
HAVUTLU MAHALLESİ KARATAŞ BLV. GÜRPA TOHUM APT.
NO:846/Z01 YÜREĞİR /ADANA/ TÜRKİYE

N. Arıcan
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



ONCROPSİENCE KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Bulv. No: 846 / Z - 01 Yüreğir / ADANA
Tel. 0322 459 78 81 - Fax: 0322 459 78 82
Yüreğir V.D. 6430381160

M. Şükrü ABAY

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür